



Аптечка першої допомоги для котів і собак VetEduCare



2025

Навігація по гайду

[Ветеринарні документи і інформація про улюбленця](#)

[Засоби догляду](#)

[Профілактичні обробки](#)

[Медикаменти](#)

[Інструменти і медичні засоби](#)

[Інструкція до дій.](#)



Ветеринарні документи і інформація про улюбленця

- Ветеринарний паспорт із відмітками про вакцинації, обробки проти паразитів, дані мікрочіпу
- Історія хвороб, алергій, досліджень, операцій (в паперовому чи електронному вигляді)
- Контакти: ветеринарні онлайн консультації VetEduCare, ветеринарна клініка

Засоби догляду

Лосьйони для вух: Otifree / Аурікап / Epiotic Virbac

Догляд за очима: стерильний фізіологічний розчин 0,9%

Кігтеріз, пилочка – для догляду за кігтями.

Зубна паста: Orozyme / Plaqtiv+

Шампунь і кондиціонер відповідно до типу шерсті

Паста для виведення шерсті – для котів: Malt Soft GimCat

Віск для лап для собак – захист від холоду взимку, хімічного впливу, опіків влітку.

Для безшерстих собак, котів – крем від засмаги влітку.



Профілактичні обробки

Препарати від зовнішніх та внутрішніх паразитів.

Таблиця вибору препаратів
проти зовнішніх паразитів

Таблиця вибору препаратів
проти внутрішніх паразитів

Гайд по обробкам від
зовнішніх паразитів

Гайд по обробкам від
внутрішніх паразитів

Вебінари по обробкам від паразитів



www.veteducare.com

До змісту



Медикаменти

ПРЕПАРАТ	ДОЗУВАННЯ І ШЛЯХИ ВВЕДЕННЯ	ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Рани і травми		
Хлоргексидин 0.05% розчин – 1 флакон 100 мл для дому або медичні серветки з хлоргексидином	Обробляти рану 2-3 рази на день.	Універсальний антисептик для ран (не можна застосовувати в очі та вуха!!). Обробка уражень шкіри, ран.
Фізіологічний розчин (натрію хлорид 0,9%) – 2 флакони 200 мл /ампули		Промивання очей, носа, вух. Промивання ран, очистки рани від сторонніх тіл.
Вазелин медичний (без ароматизаторів)	Наносити на чисту поверхню шкіри або рану 2 рази в день, товстим шаром, щоб зберігалася волога.	Пришвидшує загоєння неінфікованих ран. Обробка сухих, потрісканих подушечок лап (особливо взимку або після прогулянок по солі). Пом'якшення ділянок із дерматитом, попрілостями, подразненнями. Змащення носа при сухості (наприклад, у брахіцефалів або при зневодненні). Змащення термометра при ректальному вимірюванні температури.
Порошок для зупинки крові (гемостатичний порошок) – Bleed Stop	Нанесіть порошок на рану у великій кількості. Сильно стисніть та утримуйте, поки кровотеча не зупиниться.	Використовується при не глибоких та глибоких порізах, при будь-якій кровотечі, при пораненнях. Діставати його з рани не потрібно, оскільки він сприймається організмом, як споріднене середовище.
Спирт етиловий 70% розчин	Обробка місця ін'єкції, рук, інструментів	Антисептик. НЕ МОЖНА НАНОСИТИ НА ВІДКРИТІ РАНИ!!!
Укуси комах		
Мазь гідрокортизонова 1% – 1 туба або ветеринарний гідрокортизоновий спрей 0,5–1%	Наносити тонким шаром на шкіру 1-2 рази на добу	Зменшення свербіжу, запалення, шкірних алергічних реакцій



Розлади травлення

Регідрон порошок (без ароматизаторів)	1 пакетик на 1 літр води. Напувати по 2-3 мл/кг кожні 2-3 години	Сольовий розчин. При проносі та зневодненні будь-якого походження. Контролювати наявність блювоти після вживання.
Пресорб (ветеринарний)	0,5-1 г/кг ваги тіла	Як сорбент при розладах травлення, підозрі на отруєння. Давати за 1,5-2 години до або після прийому їжі та прийому інших препаратів. 2-4 рази на добу
або Ентеросгель капсули / паста	1-2 капс. для тварин вагою понад 10 кг, 1/2-1 чайна ложка – 1 ст. ложка на тварину	
або Атоксіл	0,2 г/кг маси тіла на добу. Розводити з водою за інструкцією і вживати – 5 мл розчину на кг ваги на добу. Добову дозу розділити на 2-4 прийоми	
Пробіотик Фортіфлора	1 пакетик 1 раз на день на тварину любого розміру	Нормалізує діяльність кишечника та покращує баланс мікрофлори. Можна замінити на інший ветеринарний аналог.
Паста для виведення шерсті для котів	Дозування згідно інструкції до конкретної пасти.	Профілактика створення комків шерсті в шлунково-кишковому тракті (пілобезоарів) і непрохідності, яку вони можуть викликати. Використовувати курсами або постійно.

Очі-вуха

Лосьйон для вух	Закапайте невелику кількість лосьйону безпосередньо у вушний канал (зазвичай 0,5-1 мл для кота чи маленького собаки, 1-2 мл для великих порід). Обережно помасажуйте основу вуха 20-30 секунд, щоб рідина розподілилася і розм'якшила бруд. Дайте тварині потрясти головою, потім акуратно витріть зовнішню частину вуха ватним диском чи марлевою серветкою. Не використовуйте ватні палички.	Використовують при забрудненні вушної раковини по мірі необхідності. При лікуванні – за рекомендацією ветеринара.
Лосьйон для очей	Змочіть ватний диск або марлеву серветку лосьйоном. Акуратно протріть від куточка ока назовні. Для кожного ока використовуйте новий диск. Не торкайтеся наконечником флакона до ока чи вій.	Для гігієни – 1-2 рази на тиждень або за потреби (після прогулянок, при виділенні). При лікуванні – тільки за призначенням ветеринара.



Протизапальна, знеболююча терапія

Мелоксивет - суспензія 1мг/мл,
флакон 10 мл

Собаки: в перший день лікування 0,2 мл/кг маси тіла, в наступні дні - 0,1 мл/кг маси тіла тварини.
Коти: в перший день лікування 0,1 мл/кг маси тіла, в наступні дні - 0,05 мл/кг маси тіла тварини.

За призначенням лікаря. Знеболення, зменшення запалення, жарознижуюча дія.

Протипоказання: запальні захворювання шлунково-кишкового тракту, з обережністю при захворюваннях нирок, печінки.

Перед застосуванням вміст флакону з препаратом необхідно підігріти до 30°C та струсити.

Раз на 3-6 місяців перевіряйте терміни придатності препаратів і медичних засобів. Своєчасно замінюйте ті, термін придатності яких добігає кінця.



Інструменти і медичні засоби

Інструменти та витратні матеріали	
Термометр електронний (якщо немає електронного – ртутний)	1 шт.
Пінцет	1 шт.
Ножиці (краще медичні)	1 шт.
Затискач гемостатичний	1 шт.
Викручувач для видалення іксодових кліщів	1 шт.
Шприци одноразові: - Інсулінові на 100 одиниць (легше дозувати) – для котів та маленьких собак	5 шт.
- 2 мл	5 шт.
- 5 мл	2 шт.
- 10 мл	2 шт.
- 20 мл	2 шт.
Рукавички нестерильні	2 пари
Пластир у катушці ширина 2,5 см	1 шт.
Ветеринарний еластичний пластир (флексі)	1 шт.
Бинт нестерильний та стерильний	по 1 шт.
Вата	1 уп.
Джгут для зупинки кровотечі	1 шт.
Комір або нашийник для захисту від розлизування	1 шт.



Інструкція до дій.

Обробка ран:

- Оцініть: розмір, глибину, кровотечу, забруднення, локалізацію. Чи видно сухожилля, кістку, «кишені»?
- Зупиніть кровотечу: прямий тиск стерильною серветкою 5–10 хв, надавити рукою і не відпускати. Стандартний турнікет — лише при життєзагрозливій кровотечі на кінцівці.
- Промивання і зволоження рани: 200–500 мл 0,9% NaCl під помірним тиском (шприц). Якщо немає розчину — охолола кип'ячена вода.
- Антисептик – хлоргексидин 0,05%. Обробити рану, не заливати глибоко в тканини.
- Стрижка шерсті навколо (2–3 см), обережно, щоб не розширити травму.
- Пов'язка: серветка + зовнішній фіксуючий бинт + самофіксуючий еластичний. Не перетискати!
- Захист від вилизування: комір обов'язково.
- Контроль: перев'язка 2 рази на день.

Що не використовувати:

- Перекис водню, спирт, зеленку/йод нерозведений — травмують тканини, сповільнюють загоєння.
- Антибіотики “на всяк випадок” – ризики резистентності, побічні ефекти. Тільки по показанням і за призначенням лікаря.
- Людські знеболювальні – ібупрофен, німесулід, кеторолак тощо. Це небезпечно для тварин.

Червоні прапорці (потрібен ветеринар негайно):

- ▶ глибокі/рвані рани, укуси, масивне забруднення/некроз;
- ▶ сильна або пульсуюча кровотеча;
- ▶ підозра на проникнення в суглоб/грудну/черевну порожнину;
- ▶ кульгавість, гарячка, млявість, видимі сухожилки/кістка;
- ▶ з'явився запах, набряк, гній, біль;
- ▶ рана на повіці, лапах-подушечках із великим дефектом, у ділянці ануса/геніталій;
- ▶ будь-яка рана у кошенят/цуценят, тварин з цукровим діабетом, ХЗН тощо.



Травми

1. Для гострих м'якотканинних травм (розтяг, забій) – перші 24–48 год холод 5–10 хв 3–4 рази на день.
2. Спокій/обмеження навантажень.
3. Протизапальні засоби — лише ті, що призначив ваш ветеринар із дозою та тривалістю.

Червоні прапорці (потрібен ветеринар негайно):

- ▶ біль при дотику/кульгавість >24 год;
- ▶ підвищена температура;
- ▶ неврологічні симптоми;
- ▶ погіршення загального стану.

Що не робити:

Не використовувати людські знеболювальні (парацетамол/ібупрофен/кеторолак/аспірин)

Не використовувати “подвійні” нестероїдні протизапальні засоби або у поєднання із стероїдними — високий ризик виразок/шкоди для нирок.

Довгі «самостійні» курси навіть ветеринарних протизапальних засобів без контролю лікаря.



Укуси комах (комарі, оси/бджоли, мурахи)

- Холод 5–10 хв через тканину.
- Місце укусу — очистити, обробити хлоргексидином, за потреби тонкий шар гідрокортизону в мазі або спреї (1–2 рази на добу до 2 днів).
- Слідкуйте, щоб не слизував (комір).

Що не робити:

Не прикладати оцет/соду/спирт;

Не колоти «домашні» уколи.

Червоні прапорці (потрібен ветеринар негайно):

- ▶ швидкий набряк морди/повік;
- ▶ труднене дихання;
- ▶ блювання/колапс → терміново до клініки (ризик анафілаксії).



Розлади травлення (разова діарея/м'які випорожнення без крові, без блювання, збережена активність)

1. 12–24 год дієтичне харчування (відварене нежирне м'ясо, рис, лікувальні дієти для захворювань ШКТ), вода — у вільному доступі.
2. Випоювати сольові розчини невеликими порціями згідно норм дозування.
3. Можна дати сорбенти - пресорб, ентеросгель, атоксил за інструкцією.
4. Пробіотик за інструкцією 3–5 днів.
5. Після нормалізації стану поступове повернення до звичного корму за 2–3 дні.

Що не робити:

Не давати людські протидіарейні (лоперамід котам небезпечний; собакам — тільки за призначенням),

Не голодувати довше 24 год (особливо котам, цуценятам, кошенятам, собакам карликових порід).

Червоні прапорці (потрібен ветеринар негайно):

- ▶ кров у калі/чорний стілець,
- ▶ багаторазове блювання,
- ▶ температура,
- ▶ сильна біль,
- ▶ цуценята/кошенята,
- ▶ хронічні хвороби,
- ▶ підозра на стороннє тіло.



Якщо сталася надзвичайна подія, а потрапити до лікаря ви фізично не можете, напишіть нам тут:


Ветеринарні онлайн консультації

Або зареєструйтесь на найближчий час на нашому сайті:


www.veteducare.com



Наш сайт



Телеграм спільнота



Instagram

